



Esquema Nacional de Vacunación Panamá 2011



RECIÉN NACIDO	2 MESES 4 MESES 6 MESES 8 MESES	12 MESES	18 MESES	4 AÑOS	6 AÑOS	9 A 12 AÑOS	14 A 19 AÑOS
							
<p><i>Si tiene más de 12 horas, no aplicarla, e iniciar el esquema a los 2 meses.</i></p> <p>Hepatitis B 1 Dosis</p> <p>B.C.G. 1 Dosis <i>(puede aplicarse hasta los 15 años de edad)</i></p>	<p>Neumococo Conjugada 13 Valente 2 Dosis (4 a 8 semanas entre dosis)</p> <p>Polio Intramuscular 3 Dosis (4 a 8 semanas entre dosis)</p> <p><i>Para pacientes inmunosuprimidos y VIH positivo</i></p> <p>Polio Oral 3 Dosis (8 semanas entre dosis)</p> <p>Pentavalente (DPT – HIB – HPB) 3 Dosis (8 semanas entre dosis) <i>Se puede aplicar hasta los 24 meses</i></p> <p>Rotavirus 2 Dosis (de 4 a 8 semanas entre dosis)</p> <p>6 A 11 MESES</p> <p>Influenza 2 Dosis</p>	<p>Triple Viral (M.M.R. ó SPR) 1 Dosis</p> <p>Hepatitis A 1 Dosis <i>(se puede aplicar hasta los 5 años)</i></p> <p>Neumococo Conjugada 13 Valente Refuerzo</p> <p>12 A 15 MESES</p> <p>Fiebre Amarilla <i>Solo se aplica en las regiones de Darién, Panamá Este y Kuna Yala y Vacunación Internacional</i> 1 Dosis</p>	<p>Polio Oral 1er refuerzo</p> <p>Polio Intramuscular 1er refuerzo</p> <p>Hepatitis A 1er refuerzo</p> <p>Tetraivalente (DPT – HIB) 1er refuerzo</p>	<p>Polio Oral 2do refuerzo</p> <p>Triple Viral (M.M.R. ó SPR) 2do refuerzo</p> <p>D.P.T. 2do refuerzo</p>	<p>Polio Oral* Refuerzo</p> <p>Td Adulto* Refuerzo</p> <p><i>* Para quienes no recibieron segundo refuerzo antipolio y D.P.T.</i></p>	<p>Hepatitis B 2 Dosis (4 semanas entre dosis)</p> <p>1 refuerzo (6 meses después de segunda dosis)</p> <p>10 AÑOS</p> <p>Papiloma Virus (10 años) 3 Dosis <i>(1 mes después de la primera dosis y 6 meses después de la primera)</i></p> <p>11 A 12 AÑOS</p> <p>Fiebre Amarilla Refuerzo</p> <p>TDAP (ADACEL) Refuerzo</p> <p>Hepatitis B (12 años) Refuerzo</p>	<p>Hepatitis B (14 y 15 años) 2 Dosis</p> <p>M.M.R. (14-19 años) Refuerzo <i>(si nunca ha sido vacunado)</i></p>



GOBIERNO NACIONAL
REPÚBLICA DE PANAMÁ

