



## VACUNAS

### ¿Qué son las vacunas?

Las vacunas son inyecciones que se requieren para proteger a nuestros hijos de enfermedades peligrosas durante la niñez.

### ¿Cuál es el esquema de vacunas en Panamá?



El Ministerio de Salud a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) establece las vacunas que deben tener los niños en nuestro país. En la tabla siguiente están las obligatorias.

VACUNAS	Al nacimiento	2 meses	4 meses	6 meses	6-11 meses	1 año	18 meses	4-5 años	10 años
BCG	X								
Hepatitis B *	X								
Hepatitis A						X	X		
POLIO ORAL	X	X	X	X			X	X	
Rotavirus **		X	X						
Pentavalente (Difteria, tos ferina, tétano, meningitis H.influenzae tipo b, hepatitis B)		X	X	X					
Tetravalente (Difteria, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b)							X		
MMR (Paperas, sarampión, rubéola)						X		X	X ^
DPT								X	
Influenza (gripe) ***					X				
TD								X (> 6 a)	
Fiebre amarilla **						X			

\* Si el RN tiene más de 12 horas no aplicarla e iniciar esquema a los 2 meses.

\*\* No debe aplicarse a niños mayores de 6 meses.

\*\*\* La primera vez se colocarán 2 dosis en menores de 24 meses, luego aplicar anualmente

\*\* Sólo se aplica en las regiones de Darién, Panamá Este y Kuna Ayala y Vacunación Internacional.

^ Solo se aplica sino recibió el primer refuerzo a los 5 años

### **¿Son estas las únicas vacunas que tú hijo necesita?**

No, hay otras vacunas que son importantes para tú hijo y que todavía no son dadas de forma gratuita por nuestro esquema nacional de vacunas hasta el momento, como son:

<b>Vacunas</b>	<b>Dosis</b>	<b>Edades de administración</b>
<b>Varicela</b>	2 con una separación de 1 mes entre ambas (niños menores de 12 años según la AAP) 2 (niños mayores de 12 años)	<b>1 año</b>
<b>Vacuna neumococo heptavalente</b>	4	<b>2,4,6 meses y 15 meses</b>



### **¿Sí mi hijo está resfriado ¿Puedo colocarle las vacunas?**

Sí, su hijo puede recibir sus vacunas sin problema.

### **¿En qué situaciones NO se puede colocar las vacunas?**

Cuando su hijo padece de Leucemia, SIDA y afectan su estado de defensa, su pediatra le indicará cuáles vacunas puede recibir.

Cuando ha recibido transfusiones de sangre o inmunoglobulina en los últimos 3 meses o si toma tratamientos con corticoides por largo tiempo.

Si el niño es alérgico al huevo, antibióticos o conservantes en la vacuna.

### **¿Cuáles son los efectos de las vacunas?**

Los efectos son breves y duran poco, pueden aparecer a las pocas horas o hasta 10 días después de colocarla, como son aumento de volumen (hinchazón) en el sitio donde se colocó la inyección, también puede tener fiebre y malestar general.

Cuando reciba la vacuna de sarampión y rubéola puede presentar un leve salpullido o erupción en su cuerpo.

### **¿Qué hacer?**

En caso de fiebre mayor de 38° C ,dar el medicamento para la fiebre indicado por su pediatra, si persiste llamar a su médico.

Dar muchos líquidos.

Colocar compresas de agua tibia o fría en el área enrojecida.

**¡Recuerde que las vacunas previenen enfermedades  
son gratuitas en tú centro de Salud;**